



www.drmehmetkurkcu.com.tr

AMELİYAT SONRASI TALİMATLAR-İLAÇLAR VE ALERJİK REAKSİYONLAR

Hastalarımız kızarıklık veya kaşıntı gelişirse veya ilaçlarla ilgili herhangi bir endişeleri varsa, bu ilaçları almayı bırakmalı ve derhal Dr. Mehmet Kürkcü ile temasa geçmelidirler. Bulantı, kusma, mide rahatsızlığı, ishal, kabızlık, baş dönmesi, bayılma, uyuşukluk, baş ağrısı, ruh hali değişiklikleri, idrar sorunları, kaygı, uyku bozuklukları veya mantar enfeksiyonları da ilaçların yan etkileri olabilir. İlaçlara reaksiyon gelişmesi durumunda, mümkün olan en kısa sürede Dr. Mehmet Kürkcü ile iletişime geçilmelidir.

Genel anestezi altında yapılan ameliyatlardan sonrasında ağrı kesici ilaç alan hastaların aniden ayağa kalkarken veya yatar pozisyonundan ayağa kalkarken dikkatli olmaları gerekir. Tansiyon düşmesi ve buna bağlı baş dönmesi ve hatta bayılma olabilir. Hızla gelişen bilinç kaybı yaralanmayla sonuçlanabilir. Hastalar ameliyattan sonra yatıyorlarsa, ayağa kalkmadan önce oturmalı tansiyon dengelendikten sonra ayağa kalkmalıdır. Gerekirse yardım isteyiniz.

Genel anestezi veya sedasyon sırasında ve sonrasında kullanılan ilaçların hastaların uykulu olmasına, reflekslerinin yavaşlamasına neden olabileceğini unutmamak önemlidir. Hastalar bu ilaçları alırken veya genel anestezi veya sedasyon aldıktan sonra 24 saatten daha erken bir sürede otomobil kullanmamalı, dikkat gerektiren makineler ile çalışmamalı veya yaralanmaya neden olma potansiyeli olan faaliyetlere katılmamalıdır. Bu süreç boyunca alkollü içeceklerden kaçınılmalıdır. Obstrüktif uyku apnesi, horlaması olan veya uyku düzeni bozulan hastalar Dr. Mehmet Kürkcü'ye bilgilendirmelidir.

Hastalar Dr. Mehmet Kürkcü'ye danışmadan reçeteli ilaç dozajını artırmamalıdır. Reçeteli ilaçlar başkalarına verilmemeli ve hastalar eczane dışında bir kaynaktan ilaç kabul etmemelidir. Hastalar, reçetesiz satılan ilaçlar (aspirin, soğuk algınlığı ilaçları), ve takviyeler de dahil olmak üzere başka ilaçlar kullanıyorlarsa Dr. Mehmet Kürkcü'ye bilgi vermelidir. İlaçların alkol, antihistaminikler, benzodiazepinler (diazepam vb) gibi anti-anksiyete ilaçları ve uyumaya yardımcı ilaçlar ile potansiyel etkileşimleri olabilir. Geçmişinde madde bağımlılığı olan veya bağımlılık uyarı işaretlerinden herhangi birini yaşayan hastalar bu konuyu Dr. Mehmet Kürkcü ile konuşmalıdır.