



www.drmetkurkcu.com.tr

AMELİYAT SONRASI TALİMATLAR - ATEŞ VE ENFEKSİYON

Ameliyattan sonraki ilk iki gün aralıklı olarak düşük dereceli ateşin olması normal olabilir. Hastanın ateşi 38 C° ulaşırsa, üşüme, iştah kaybı, sıvı alamıyorsa veya enfeksiyon endişesi varsa derhal Dr. Mehmet Kürkcü ile temasa geçilmelidir.

Yara enfeksiyonları nadiren ortaya çıkabilir. Bunlar genellikle ameliyattan sonraki üçüncü veya dördüncü günden sonra ortaya çıkar. Enfeksiyonlara ateş, artan şişlik ve ameliyat bölgelerinde kötüleşen ağrı ve kızarıklık eşlik eder. Ateş genellikle 38 C° den yüksektir ve birkaç gün devam eder. Şişlik ağız içinde oluşabileceği gibi ağzın dışından da görülebilir hale gelebilir. Hastalar ayrıca ağızlarında sıvı akıntısı, kötü tat veya ağız kokusu da fark edebilirler.

Çekim veya ameliyat bölgesindeki yiyecek veya kalıntılar enfeksiyon kaynağı olabilir. Başlangıçta sorunsuz bir iyileşme sonrasında veya hastanın durumunun ilk iyileşmeden sonra kötüleşmesi durumunda enfeksiyonlardan şüphelenilmelidir. Ameliyat öncesinde de enfeksiyonu olan hastalarda inatçı yara enfeksiyonu ameliyat veya antibiyotik tedavisinden sonra iyileşme görülmeyebilir. Enfeksiyondan sorumlu bakterileri belirlemek için kültür alınması ve enfeksiyonla savaşmak için gerekli antibiyotik tedavisini belirlemek üzere laboratuvarında analiz edilmesi gerekebilir.

Tipik olarak enfeksiyon riski taşıyan hastalar sıklıkla cerrahi bölgedeki enfeksiyonlarla ilgili kronik problemlere sahiptir. Genellikle enfeksiyon için daha önce birden fazla antibiyotik tedavisi uygulanmıştır. Enfeksiyon riski taşıyan diğer hastalar arasında bağışıklık sistemini tehlikeye sokan tıbbi rahatsızlıkları olanlar (diyabet, uzun süreli steroid tedavisi görenler veya organ nakli olanlar veya diğer bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı) sigara içenler, ağız hijyeni kötü olan ve diş eti hastalıkları olan ve yetersiz beslenmeye sahip olan hastalar sayılabilir.

Enfeksiyonların tedavisi daha uzun süreli antibiyotik veya birden fazla antibiyotik gerektirebilir. Bazen hastaların enfeksiyonu boşaltmak için ek ameliyata ihtiyacı olabilir. Nadir durumlarda intravenöz antibiyotik tedavisi için hastaneye yatırmak ve gözlem gerekli olabilir.