



www.drmehmetkurkcu.com.tr

AMELİYAT SONRASI TALİMATLAR:

DİKİŞLER, UYUŞMA, DUDAK KENARINDA ÇATLAK

Dikişler

Dr. Mehmet Kürkcü, alınması gereken dikişler veya kendiliğinden düşen dikişler (emilebilir veya çözünebilir dikişler) kullanabilir. Bu dikişler bir hafta sonar alınmalıdır. Birçok kişi dikişlerin alınması konusunda endişe duymaktadır (emilebilir olsun ya da olmasın), ancak bu aslında ağrısız bir işlemdir. Hastaların emilebilir sütürlerin kaybolmadığını anlaması önemlidir. Hastalar bu dikişlerin "düşüğünü" fark edebilirler. Emilebilen dikişler farklı sürelerde kısmen eriyerek düşer. Bu amamen normaldir. Bazı emilebilir dikişler on günden iki haftaya kadar veya daha uzun süre dayanabilir. Emilebilir dikişler bir haftadan uzun kalıyorlarsa alınması gereklidir. Hastaların dikişlerle ilgili soruları varsa Dr. Mehmet Kürkcü veya ekibiyle iletişime geçmeleri uygun olacaktır.

Uyuşma

Lokal anestezinin etkisi birkaç saat sürebilir. Dudaklarınızı ve dilinizi yakmamaya, ısırılmamaya veya başka şekilde travmatize etmemeye özel dikkat gösterilmelidir. Nadiren ameliyatla aynı tarafta alt dudak, çene veya dilde uyuşma meydana gelebilir. Ameliyat sonrası ziyaretinizde bunu belirtiniz. Bu konudaki riskler ve tedavi size ameliyat öncesinde açıklanacaktır.

Dudak kenarında çatlama

Ameliyat sonrasında ağzınızın köşeleri çatlayabilir veya ağrıyabilir. Hastalarımız dudaklarını vazelin, dudak nemlendiriciler veya A ve D Vitamini içeren cilt kremleri kullanarak nemlendirmeleri önemlidir. Lokal veya genel anestezi ile yapılan ameliyatlarda gerekli olan durumlarda Dr. Mehmet Kürkcü gerekli tedbirleri alacaktır.